RACCOMANDAZIONI
CLINICO-TERAPEUTICHE
SULL'OSTEONECROSI DELLE
OSSA MASCELLARI (ONJ)
ASSOCIATA A FARMACI E SUA
PREVENZIONE

Alberto Bedogni
Giuseppina Campisi
Vittorio Fusco

4. *DIAGNOSI di ONJ* *- radiologia*

Versione 2.0/2015
Aggiornato a ottobre 2017

Indice

- ✓ Ruolo della diagnostica per immagini
 - **OPT e Radiografie endorali**
 - **TC volumetrica/TC a raggio conico (CBCT)**
 - **RM**
 - Scintigrafia ossea
 - PET, TC/PET, SPECT e SPECT/TC
- ✓ **Segni radiologici di ONJ**
- ✓ **Contributo radiologico alla diagnosi di ONJ**

✓ Ruolo della diagnostica per immagini

- **Diagnosi differenziale**
- **Individuazione**
- **Estensione**
- **Stadiazione**
- **Complicanze**
- **Monitoraggio**

✓ Ruolo della diagnostica per immagini

“L’ONJ è una malattia dell’osso, che interessa solo parzialmente i tessuti molli”.

Necessità di imaging mirato

✓ Ruolo della diagnostica per immagini

Quale indagine più indicata per la diagnosi?

- **OPT e Radiografie endorali**
- **TC spirale / TC a raggio conico (CBCT)**
- **Risonanza Magnetica (RM)**
- **SCINTIGRAFIA OSSEA**
- **PET, TC/PET, SPECT e SPECT/TC**

OPT vs TC

Computerized tomographic findings in bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw in patients with cancer

Silvio Diego Bianchi, MD,^a Matteo Scoletta, DDS,^b Francesca Bozzalla Cassione, MD,^c Giuseppe Migliaretti, MS,^d and Marco Mozzati, MD,^e Turin, Italy
UNIVERSITY OF TURIN

Objectives. To study bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw with respect to radiographic, demographic, and clinical features.

Study design. Thirty-two patients with painful exposed bone in the jaws subsequent to treatment with bisphosphonates for various neoplastic diseases were examined with both dental panoramic radiograph and multislice spiral computerized tomography (CT). Each case was assessed for the following radiologic signs: structural alteration of trabecular bone, cortical bone erosion, osteosclerosis, small sequestrum, extensive sequestrum, and presence of periosteal new bone. The McNemar, χ^2 , and Kruskal-Wallis tests were performed to analyze the association between radiologic signs, demographic data, clinical aspects of the lesion, and type and duration of bisphosphonate therapy. Hierarchical cluster analysis was used to group patients into categories on the basis of CT signs and dental panoramic radiograph signs. The agreement between CT and dental panoramic radiograph clusters was analyzed by kappa index.

Results. Dental panoramic radiograph proved positive for features of osteonecrosis in 18 cases and CT in 30. Computerized tomography was far superior to dental panoramic radiograph in detecting all the radiologic signs. The cluster analysis applied to CT signs showed a classification of the 32 patients in 4 categories characterized by an increasing number of signs coherent with the clinical extension of the lesions. Structural alteration of trabecular bone and cortical bone erosion, a constant finding in the 30 positive CTs, could be sometimes differentiated only with difficulty from those due to recent extraction. Dental panoramic radiograph missed the correct diagnosis of sequestration in 15 cases. Intense periosteal reaction was often found. The most extensive maxillary lesions were associated with new bone formation in Schneider mucous membrane, never described previously, and oroantral communications.

Conclusions. Dental panoramic radiograph were found to be of limited use in assessing bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw in patients for whom CT imaging was subsequently ordered. (*Oral Surg Oral Med Oral*

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Aug;104(2):249-58

OPT vs CBTC

Vol. 109 No. 5 May 2010

Oral Surgery, Oral Medicine,
Oral Pathology, Oral Radiology, and
Endodontology

ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY Editor: William C. Scarfe

Use of cone-beam computerized tomography for evaluation of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws

Nathaniel S. Treister, DMD, DMSc,^{a,b} Bernard Friedland, BChD, MSc, JD,^b and
Sook-Bin Woo, DMD, MMSc,^{a,b} Boston, Massachusetts
BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL AND HARVARD SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

Background and objective. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws (BONJ) is characterized by exposed nonvital maxillary or mandibular bone. Cone-beam computerized tomography (CBCT) is an attractive modality for 3-dimensional imaging of the jaws. The purpose of this study was to compare the clinical and radiographic features of a series of 7 subjects with BONJ who were evaluated by both CBCT and digital panoramic radiography.

Study design. Seven subjects with BONJ were evaluated by clinical examination, CBCT, and digital panoramic radiography.

Results. Radiographic findings included sclerosis, cortical irregularity, lucency, mottling, fragmentation/sequestra formation, sinus communication, and persistent sockets. There was high correlation between the anatomic location of clinical and radiographic findings. In nearly all cases, CBCT demonstrated a greater extent and quality of changes compared with panoramic radiography.

Conclusions. Cone-beam CT is superior to panoramic radiography in its ability to characterize the nature and extent of radiographic changes in BONJ. Use of CBCT should be strongly considered when radiographic evaluations are included in prospective research investigations of BONJ. However, in the majority of cases of BONJ the clinical significance of improved imaging remains unclear, and therefore specific guidelines for routine clinical care cannot be recommended at this time. (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;109:753-764)

*“La Commissione ritiene che l’**OPT** e la **TC** siano da considerarsi le **tecniche di indagine di primo e secondo livello rispettivamente** più utili come **complemento diagnostico**”*

OPT

screening iniziale (informazioni generali)

TC spirale

discrimina con buona approssimazione tra tessuto osseo sano e patologico

TC a raggio conico

I livello

II livello

- **Tecniche di diagnostica per immagini di I livello**

Diagnosi differenziale ONJ: ruolo della radiologia tradizionale

- **Radiografie endorali**

- **OPT**

- *Lesioni endodontiche*
- *Lesioni parodontali*
- *Lesioni cistiche odontogene*
- *Osteomieliti*
- *Secondarismi ossei*
- *Perimplantiti/mucositi perimplantari*

- Tecniche di diagnostica per immagini di II livello

- TC volumetrica (spirale)

Vantaggi	Limiti
<ul style="list-style-type: none">➤ Facile accessibilità all'esame➤ Costi contenuti (SSN)➤ Abitudine alla interpretazione del dato	<ul style="list-style-type: none">➤ Irraggiamento

- TC a raggio conico (CBCT)

Vantaggi	Limiti
<ul style="list-style-type: none">➤ Ridotto irraggiamento	<ul style="list-style-type: none">➤ Campi limitati (FOV) in odontoiatria➤ Ancora poco usata nel SSN

CBCT

AOV

WAR

Tab. 1

Tipo di esame dentale	Dose efficace (μSv)
Esame radiografico dentale intraorale	1 - 8
Esame panoramico dentale	4 - 30
Esame cefalo metrico	2 - 3
Esame CBCT (per piccoli volumi dento-alveolari)	34 - 652
Esame CBCT (per grandi volumi cranio-facciali)	30 - 1079

**Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche
«Cone beam» (10A06042) (G.U. Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2010)**

- Tecniche di diagnostica per immagini di II livello
 - TC volumetrica (spirale)
 - TC a raggio conico (CBCT)

“ Prescrizione : TC del massiccio e/o mandibola in finestra da osso, a strato sottili, in proiezione assiale e coronale (eventuale ricostruzione denta-scan)”

Mezzo di contrasto da usarsi solo per escludere presenza di secondarismi ossei/tessuti molli, in caso di sospetto clinico

CBCT e ONJ

Vol. 114 No. 6 December 2012

Prevalence of cone beam computed tomography imaging findings according to the clinical stage of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw

Frank Wilde, MD, DMD,^a Marcus Heufelder, MD, DMD,^b Kai Lorenz, MD, PhD,^c Susanne Liese, MD, DMD,^d Jan Liese, MD, DMD,^d Jens Helmrich, MD, DMD,^c Alexander Schramm, MD, DMD, PhD,^f Alexander Hemprich, MD, DMD, PhD,^g Edgar Hirsch, DMD,^h and Karsten Winter, MScS,ⁱ Rostock, Leipzig, and Ulm, Germany

MILITARY HOSPITAL ULM AND ACADEMIC HOSPITAL ULM UNIVERSITY, UNIVERSITY OF ROSTOCK, UNIVERSITY OF LEIPZIG, AND TRANSLATIONAL CENTRE FOR REGENERATIVE MEDICINE

Objectives. Investigations of cone beam computed tomography (CBCT) for bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ) imaging are rare. The purpose of this study was to investigate the prevalence of typical radiological findings of BRONJ in CBCT.

Methods. Twenty-seven CBCTs of BRONJ sites were assessed on the basis of the radiological findings (cancellous bone destruction, cortical bone erosion, sequestration, osteosclerosis, and periosteal bone formation) and put in relation to the severity of the BRONJ sites.

Results. Cancellous bone destruction and cortical bone erosion were the most common findings. Occurrence seems to decrease with decreasing BRONJ severity. Sequestration and osteosclerosis were less frequent and could be seen across all stages. Periosteal bone formation occurred in high-stage BRONJ only.

Conclusion. Cancellous bone destruction, cortical bone erosion, sequestration, and osteosclerosis can be seen across all stages and prevalence seems to decrease with decreasing severity of BRONJ. The occurrence of periosteal new bone formation seems to start in high-stage BRONJ. (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012;114:804-811)

CBCT e ONJ

JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL RESEARCH

Olutayo et al.

Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw Bone: Radiological Pattern and the Potential Role of CBCT in Early Diagnosis

James Olutayo^{1,2}, Jimoh Olubanwo Agbaje³, Reinhilde Jacobs¹, Vicky Verhaeghe³, Filip Vande Velde⁴, Frans Vinckier³

¹Oral Imaging Center, Department of Dentistry, Oral Pathology and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium

²Department of Dentistry, Faculty of Clinical Sciences, University of Maiduguri, Maiduguri, Nigeria

³Department of Paediatric Dentistry and Special Dental Care, School of Dentistry, Oral Pathology and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium

⁴Private Periodontologist, Antwerp, Belgium.

To cite this article:

Olutayo J, Agbaje JO, Jacobs R, Verhaeghe V, Velde FV, Vinckier F. Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw Bone: Radiological Pattern and the Potential Role of CBCT in Early Diagnosis.

J Oral Maxillofac Res 2010 (Apr-Jun);1(2):e3

URL: <http://www.ejomr.org/JOMR/archives/2010/2/e3/e3ht.pdf>

doi: [10.5037/jomr.2010.1203](https://doi.org/10.5037/jomr.2010.1203)

CBCT e ONJ

Skeletal Radiol (2014) 43:1669–1678
DOI 10.1007/s00256-014-1951-1

SCIENTIFIC ARTICLE

Cone beam computed tomography for diagnosis of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: evaluation of quantitative and qualitative image parameters

**Roman Guggenberger · Emrah Koral ·
Wolfgang Zemann · Christine Jacobsen ·
Gustav Andreisek · Philipp Metzler**

- **Tecniche supplementari di diagnostica per immagini di II livello**

(utili in casi di dubbia interpretazione o per definire con maggiore accuratezza l'estensione del processo osteonecrotico a scopo terapeutico)

- **RM**

Vantaggi	Limiti
<ul style="list-style-type: none">➤ Discrimina vitalità osso midollare (necrosi/infiammazione)➤ Tessuti molli circostanti	<ul style="list-style-type: none">➤ Claustrofobia➤ Tempi di attesa (SSN)➤ Artefatti

- **SCINTIGRAFIA OSSEA**

- **PET, TC/PET, SPECT e SPECT/TC**

○ RM

Segni radiologici non specifici di BRONJ

Metodica	Sequenza	Osso normale	Infiammazione	Necrosi ossea
RM	▪ T1	▪ isointenso	▪ ipointenso	▪ ipointenso
	▪ T2	▪ isointenso	▪ iperintenso	▪ ipointenso
	▪ STIR*	▪ ipointenso	▪ iperintenso	▪ ipointenso
	▪ T1 Gadolinio e soppressione grasso	▪ enhancement	▪ enhancement	▪ enhancement orletto ipercaptante

*Short Tau Inversion Recovery

POSITION PAPER BRONJ (SICMF-SIPMO 2013)

○ RM – tessuto osseo

T₁

T₂

STIR

MRI	OSTEOMIELITE	OSTEONECROSI
	IPOINTENSITA' T ₁ IPERINTENSITA' T ₂ e STIR	IPOINTENSITA' T ₁ , T ₂ , STIR
	Elevato contenuto d'acqua	Basso contenuto d'acqua

○ RM – tessuti molli

Definizione degli spazi cervico-facciali

Comunicazione tra dipartimenti anatomico-funzionali contigui, con ampia possibilità di diffusione dei processi patologici

1 M. massetere, 2 m. pterigoideo interno, 3 m. pterigoideo esterno, 4 m. temporale, 5 mandibola, 6 muscolo milojoideo, 7 gh. sottomandibolare, 8 gh. parotide, 9 spazio masticatorio, 10 spazio sottomandibolare, 11 spazio sottomandibolare, 12 spazio parotideo, 13 spazio parafaringeo

RIM

Osteonecrosi/osteomielite del corpo mandibolare con fistole cutanee sottomandibolari e flemmone dello spazio masticatorio

RIM

Osteonecrosi/osteomielite del corpo mandibolare con fistole cutanee sottomandibolari e flemmone dello spazio masticatorio

○ Scintigrafia ossea total-body con TC⁹⁹

Esame funzionale utilizzato per la diagnosi ed il monitoraggio di localizzazioni scheletriche di neoplasie solide.

“La Commissione SICMF-SIPMO considera la scintigrafia ossea total-body un utile supporto diagnostico, quando già eseguito per altre ragioni, ma non ne consiglia l’esecuzione per finalità diagnostiche specifiche”

Bertoldo F et al. Nat Clin Pract Oncol 2007, 4(12): 711-721.

O’Ryan FS et al. J Oral Maxillofac Surg 2009, 67(7): 1363-1372.

○ PET, TC/PET, SPECT e SPECT/TC

Vantaggi	Limiti
<ul style="list-style-type: none">Definiscono aree di alterato metabolismo osseo	<ul style="list-style-type: none">Bassa risoluzioneNon permette la differenziazione tra flogosi e metastasiIrraggiamentoTempi di attesa (SSN)

F Dore, et al. J Nucl Med. 2009 Jan; 50(1):30-5.

F Wilde, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 ;107(3):412-9.

Arce K, Assael LA et al. J Oral Maxillofac Surg 2009 Suppl ; 67:75-84.

✓ Segni radiologici di ONJ

Precoci

Tardivi

OPT

- Ispessimento cresta alveolare e lamina dura
- Persistenza alveolo post-estrattivo
- *Sequestro*
- Slargamento spazio parodontale

- Frattura patologica
- Ispessimento canale NAI
- **Osteosclerosi diffusa**
- Radiopacità seno mascellare
- *Sequestro*
- Reazione periostale

TC

- Erosione corticale
- Ispessimento cresta alveolare e lamina dura
- **Ispessimento trabecolare**
- **Sclerosi midollare focale**
- Persistenza alveolo post-estrattivo
- *Sequestro*
- Slargamento spazio parodontale

- Fistola oro-antrale, oro-nasale, muco-cutanea
- Frattura patologica
- Ispessimento canale NAI
- Osteolisi estesa al seno mascellare
- **Osteosclerosi diffusa**
- *Sequestro*
- Reazione periostale
- Sinusite

✓ Segni radiologici di ONJ

Solo i segni TC che definiscono il grado di progressivo addensamento della matrice ossea (i.e. ispessimento trabecolare, sclerosi midollare focale ed osteosclerosi) sembrano caratterizzare le fasi iniziali di malattia, e quindi sarebbero quelli da ricercare per una diagnosi precoce.

Bisdas SN et al. Clin Radiol 2008, 63(1): 71-77.

Carneiro EP, et al. ANJR Am J Neuroradiol 2006, 27(5): 1096-97

L'addensamento osseo del segmento affetto è identificabile attraverso la comparazione con la densità ossea dei segmenti scheletrici limitrofi normali.

Hutchinson MF, et al. J Oral Maxillofac Surg 2010, 68(9): 2232-2240

Bedogni A, et al. Oral Oncol 2011, 47(5):420-4

- ✓ Segni radiologici di ONJ

Semeiotica radiologica

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #A

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #A

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #A

**ispessimento
mucoso**

sequestro

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #B

**reazione
periostale**

**sequestro
osseo**

osteosclerosi

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #B

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #B

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #C

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #C

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #C

frattura

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #D

sequestro

**fistola
mentoniera**

✓ Segni radiologici di ONJ

Caso #D

DIAGNOSI DI ONJ →

Contributo della radiologia nella diagnosi definitiva di ONJ

“Nessun segno radiologico è specifico per ONJ e deve essere sempre correlato ad uno o più criteri clinici, per poter avanzare il sospetto di malattia e giungere ad una diagnosi conclusiva”.

Il radiologo fornisce informazioni utili al clinico che deve porre la diagnosi conclusiva

Bedogni A, Campisi G et al. Raccomandazioni clinico-terapeutiche sull'osteonecrosi delle ossa mascellari associata a bisfosfonati e sua prevenzione. Ed. Cleup, 2013.

Ampia esposizione di **osso necrotico** in cresta edentula in zona 3.4/3.5 con **deiscenza mucosa vestibolare**

Le proiezioni coronali della TC evidenziano una **ampia area di sequestrazione** coinvolgente il processo alveolare da 3.3 a 3.5

Area esposizione di *osso necrotico* in corrispondenza del III sestante con *deiscenza mucosa vestibolare*

Le proiezioni coronali della TC evidenziano un ampia *area di osteosclerosi/osteolisi* coinvolgente il processo alveolare e basale da 2.4 a 2.7

*Presenza di fistola mucosa in sede 1.4 in assenza di esposizione di **osso necrotico***

*Le proiezioni coronali della TC evidenziano un'ampia **area di osteolisi** coinvolgente la compagine ossea del I sestante*

*Presenza di fistolo mucosa in sede 2.3 in assenza di esposizione di **osso necrotico***

*Le proiezioni coronali della TC evidenziano una ampia **area di osteosclerosi midollare focale** coinvolgente il processo alveolare ed erosione della corticale vestibolare in zona canina superiore di sinistra*

*Presenza di esposizione di **osso necrotico** su versante linguale in zona 4.6*

*Le proiezioni coronali della TC evidenziano un **area di osteolisi** coinvolgente il processo alveolare con erosione della corticale vestibolare e interessamento del nervo alveolare inferiore.*

**Iconografia gentilmente concessa da Bedogni A et al*

Ampia esposizione di **osso necrotico** in sede 3.3-3.6 con **deiscenza mucosa** vestibolare e linguale; si osserva anche **mucosite da farmaco**

Le proiezioni assiali e, soprattutto, coronali della TC evidenziano una ampia **area di sequestrazione** coinvolgente il processo alveolare

Hanno curato la stesura del capitolo:

- **Prof. Antonio Lo Casto**, DIBIMED, Università di Palermo
- **Dott. Alberto Bedogni**, UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale, Dipartimento NeuroScienze-DNS, Università degli studi di Padova

Grazie per l'attenzione